



Malta

Gwida għall-identifikazzjoni tal-friefet

Digà hemm eluf ta' voluntiera fl-Ewropa li qed jimxu ma program ta' moniteraġġ tal-friefet bl'għan ta' konservazzjoni. Dawn jiġbru dejta f'isem l-Iskema ta' Monitoraġġ tal-Friefet (BMS) f'pajjiżi differenti. Fil-Gżejjer Maltin ukoll twaqqaf il-BMS nazzjonali li jinkludi bosta volontiera li josservaw u jgħoddu l-friet.

Din hija gwida għall-identifikazzjoni tal-friefet li jinstabu Malta, b'illustrazzjonijiet relatati ma' l-iktar 30 speċi frekwenti li persuna għandha čans tara' fil-Gżejjer Maltin.


Din il-gwida ġiet iddiżjinjata biex tiffaċilita l-identifikazzjoni tal-friefet Mediterranji li jinstabu f'Malta waqt il-monitoraġġ imwettaq minn voluntiera li jippartecipaw fl-Iskema Ewropea ta' Monitoraġġ tal-Friefet – eBMS, b'illustrazzjonijiet ta' l-ispeċi l-aktar rikonoxxbibbi. Biex issib il-lista sħiħa tal-friefet f'Malta żur il-websajt www.butterfly-monitoring.net

L-ġħadd tal-friefet jgħin biex jipproteġihom!

Malta

L-arċipelagu Malti jikkonsisti fi grupp żgħir ta' gżejjer baxxi, li jinsabu fiziż-zona centrali tal-Mediterran, fil-İvant tas-soll Sikolo-Tuneżin. Il-klima bi sjuf sħan niexfa u xtiewi mxarrba ħief, għandha influwenza profonda fuq il-bijota tal-Gżejjer, partikolarment fix-xejriet ta' distribuzzjoni tal-veġetazzjoni. Taħt ir-reġim klimatiku preżenti, il-gżejjer ma jsostnu l-ebda xmara perenni u lanqas lagi, filwaqt li l-ogħla alitudni hija 253 metri mill-ilma. L-ambjent tal-Gżejjer Maltin huwa deskritt bħala semi-naturali, l-aktar bħala riżultat ta' koloniżazzjoni twila li wasslet għal bidla gradwali tat-terren. Il-foresti sklerofili li qabel kienu estensivi, llum huma limitati għal numru żgħir ta' siti, fil-biċċa l-kbira fregmentati, filwaqt li l-bijotopi ewlenin jinkludu firxa ta' garriga (inkluż 'phrygana') u komunitajiet steppiċi.

Boskijiet sekondarji, li jikkonsistu f'assemblaġġi ta'
makja kemm indiġeni kif ukoll arkeofitiċi, jinstabu
f'diversi sistemi ta' wiedien u rдумijiet. Ghadd ta' abitati
oħra jinkludu ekosistemi tax-xatt, għaram tar-ramel u żoni
umidi, għalkemm, kemmxnejn ristretti fil-firxa.



Il-friefet huma adattati għal ambjenti differenti li jokkupaw niċċeċ differenti ta' ambjenti li jvarjaw minn boskijiet għal steppa. Xi speċi huma magħrufa li jagħmlu 'hilltopping' fuq meded sinifikanti ta' art, filwaqt li oħrajn għandhom it-tendenza li jokkupaw bċejjeċ ta' art relativiamente iż-ġieħi. Kolonizzazzjoni b'suċċess fit-tul tiddependi fuq id-disponibbiltà tar-riżorsi; dawn jinkludu pjanti li jospitaw ix-xagħaq (larval food plants), sorsi tan-nekk tar-ambjent adattat biex isostnu l-vijabilità tal-popolazzjoni.

Għaliex tosserva l-friefet?

Il-monitoraġġ tal-popolazzjonijiet tal-friefet huwa metodu importanti għall-kejl tal-bidliet fl-ambjent. Jipprovdija dejta regolari u standardizzata biex tivvaluta l-istat ta' konservazzjoni tal-friefet u tiproduċi indikaturi li jistgħu jinfirmaw il-politika ambjentali u agrikola Ewropej. Il-ġbir ta' dejta għall-iskema ta' monitoraġġ huwa mod interessanti u rilassanti kif tqatta' fit-tit mill-ħin liberu tiegħek waqt li tgħin tifhem l-istat ta' konservazzjoni tal-friefet Maltin.


Metodoloġija biex tingħadd frieffet

Tista' tgħodd il-friefet f'ħafna postijiet f'Malta; f'park, gnien, viċin ix-xatt, madwar żoni msägħra jew f'kwalunkwe mogħidji. Kull għadd huwa importanti. Fl-iskema Ewropea, l-aktar metodoloġija użata hija l-għadd tal-friefet tul-**transetti**, bażiżkament, rotot fissi virtwali fejn il-friefet huma rregistra regolarmen (idealment darba kull ġimgħa jew ġimaghżejnejn) matul il-perjodu tat-titjira tal-farfett partikolari (flight time). Tista' toħloq it-transett tiegħek qrib id-dar jew ix-xogħol tiegħek u b'hekk tkun tista' żżurha ta' spiss.

Għażla oħra hija li tirreġistra il-friefet permezz ta' għadd ta' **15-il minuta**, li tikkonsisti fl-ġħadd ta' frieffet għal 15-il minuta f'żona partikolari. Din tista' tkun triq, żonna delimitata (bħal gnien) jew sempliċiement punt fiss. Malta għandha numru ta' żoni fejn il-friefet jistgħu jingħaddu fi kwalunkwe punt tal-ġurnata, b'għadd wieħed jew diversi 15-il minuta. L-ġħadd tal-friefet jikkontribwi xi għax-xjenza filwaqt li jgħin għall-protezzjoni tagħhom.

Regoli bažiči li għandhom jiġu segwiti waqt il-monitoraġġ tal-farfett:

- Għodd l-ispeċi kollha tal-farfett f'kaxxa immaġinjarja, 2.5m fuq kull naħha u 5m quddiem u 'I fuq minnek (bħal fl-istampa)
- Imxi t-transett / rottie tiegħek b'pass kajman u kostanti
- Iż-żjarat għandhom isiru f'temp tajjeb: xemxi u sħun, mingħajr xita u mingħajr wisq riħ
- Irrapporta r-rekords tiegħek lill-koordinaturi nazzjonali jew lil eBMS



Fejn tissottometti d-dejta?

Tista' tuża l-applikazzjoni tal-mobajl eBMS, '**ButterflyCount**', biex tirrekordja Counts ta' 15-il minuta jew transetti. Din l-applikazzjoni tista' tigi installata fuq [Android](#) jew [iOS](#) u tippermetti l-ghadd tal-friefet fil-pajjiżi Ewropej kollha. Awtorizza il-GPS tiegħek u l-app tirrekordja r-rottie tiegħek waqt li tgħodd il-friefet.

Jekk trid tgħinna nghoddu l-friefet, tista' toħloq kont fuq il-websajt eBMS bl-ġajnejha tal-koordinatur tal-BMS (www.butterfly-monitoring.net), u tista' mbagħad tibda tgħodd il-friefet!




Kif tuża l-Gwida

F'din il-gwida, tista' ssib l-istampi tat-30 speċi ta' frieffet li huma magħrufa li jinstabu f'Malta, inkluzi speċi li huma relattivament prevalent u xi wħud li huma kkunsidrati rari ħafna (magħrufa minn wieħed sa ftit individwi).

L-ispeċi tal-friefet huma organizzati f'5 familji (ara l-margini tal-pażġna). Kull speċi ta' farfett għandha kemm isem Inglijż komuni kif ukoll xjentifiku (miktub bil-korsiv). L-informazzjoni tinkludi l-perjodu tat-titjira ta' kull speċi, il-kategorija tad-daqs u l-i-status ta' okkorrenza (ara l-leġġenda fuq il-qoxra ta' wara tal-gwida). L-identifikazzjoni tal-farfett ħafna drabi ssir l-aħjar bl-użu tar-ritratti. Iċċekkja l-karatteristiċi dijanjostici enfasizzati bi vleġegħ jew crieiki u rimarki biex jgħinuk fl-identifikazzjoni. Il-perjodu ta' xħur tat-titjira juri meta l-ispeċi tista' tidher. Għal xi speċi, din l-informazzjoni mhix inkluża minħabba l-ftit rekords li ġew irrapprtati, għalhekk, il-probabiltà li tiltaqa' magħhom hija baxxa.





Swallowtail - *Papilio machaon*



daqs u denb twil








J F M A M J J A S O N D

Large White - *Pieris brassicae*

Green-Striped White
Euchloe belemia

Rari (żewġ
rekords)

Bath White - *Pontia edusa*Small White - *Pieris rapae*Clouded Yellow - *Colias crocea*Cleopatra - *Gonepteryx cleopatra*Southern Comma - *Polygonia egea*Large Tortoiseshell - *Nymphalis polychloros*

kannella tan-nugrufun
b'punti oranđo / sofor



Speckled Wood - *Pararge aegeria*



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




oranđo b'marki
kannella



Wall Butterfly - *Lasiommata megera*



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Meadow Brown- *Maniola jurtina*



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

il-ȝewnah̫ ta'
wara mhux
fit-tond



il-ȝewnah̫ ta'
wara tond

Small Heath - *Coenonympha pamphilus*



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Red Admiral - *Vanessa atalanta*



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

diversi tikek
kbar (eye spots)



Painted Lady - *Vanessa cardui*



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Blachier's Grayling - *Hipparchia blachieri*



Rari (tlet rekords)



Plain Tiger - *Danaus chrysippus*




J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

HESPERIIDAE



Pigmy Skipper - *Gegenes pumilio*



LYCAENIDAE



Green Hairstreak - *Callophrys rubi*

Rari (rekord wieħed)



strixxa bajda
wiesgħa fuq
in-naħha ta' taħbi
tal-ġwienah ta'
wara



Long-Tailed Blue - *Lampides boeticus*





♀



il- mara: blu
b'diffużjoni ta'
kulur skur



kannella ċar
b'linji bojod
immewġin



Lang's Short-Tailed Blue - *Leptotes pirithous*



kulur oranġo
kontrastanti u
kannella-griz




tikka
nieqsa



Small Copper - *Lycaena phlaeas*



Brown Argus - *Aricia agestis*



Velvet-Potted Blue - *Azarus ubaldus*

Stabilis recentament

Dark Grass Blue - *Zizeeria karsandra*

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




denb

Geranium Bronze - *Cacyreus marshalli*


J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Holly Blue - *Celastrina argiolus*



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Silver-Studded Blue - *Plebejus argus*

Rari (rekord wieħed)

Chapman's Blue - *Polyommatus thersites*

Rari (żewġ rekords)

tikka
karatteristika

♂

Southern Blue - *Polymmatus celina*

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Butterfly Conservation Europe u ġ-Ċentru tar-Renju Unit għall-Ekoloġija u l-Idroloġija (UKCEH) ffurmaw l-Iskema Ewropea ta' Monitoraġġ tal-friefet (eBMS) biex tingabar dejta minn skemi differenti ta' monitoraġġ tal-friefet mad-war l-Ewropa. Il-pajjiżi membri kollha jaqsmu din d-dejta kull sena mad-database eBMS, biex janalizzaw ix-xejret tal-popolazzjoni tal-ispeċi tal-friefet Ewropej u l-indikaturi ta' dawn l-ispeċi.

Żur il-websajt eBMS www.butterfly-monitoring.net biex titgħallim kif tibda t-transett tiegħek u kif tirrekordja d-dejta tal-friefet. Jekk trid tgħinna ngħoddu l-friefet, ikkuntattja lill-koordinaturi nazzjonali: Prof. Louis F Cassar louis.f.cassar@um.edu.mt u butterflymonitoring@um.edu.mt

Din il-gwida għiet iż-żifra minn DG-Env (Kummissjoni Ewropea) taħt il-kuntratt tas-servizz SPRING u jinstab u jitniżżejj mill-websajt eBMS:

www.butterfly-monitoring.net/field-guides

Awturi: Cristina G. Sevilleja (ABLE project officer), Louis F. Cassar (Institute of Earth Systems, University of Malta), John J. Borg (National Museum of Natural History) and Christa M. Pisani (Institute of Earth Systems, University of Malta).

Fotografija: Guido Bonett, Aldo Catania, Sergio B. Marques Teixeira, Martin Wiemers and Chris van Swaay. Paolo Mazzoni and Marco Bonifacino (www.lept.its)

Disinn grafiku: Eveline van der Jagt

eBMS - European Butterfly Monitoring Scheme
SPRING - Strengthening Pollinator Recovery through
INdicators and monitorinG



Status ta': ● Nativ ● Aljen
okkorrenza: ● Migrant

Il-perjodi tat-titjira ntgħażlu abbaži ta' Cassar, L. F. (2018). *A revision of the Butterfly Fauna (Lepidoptera - Rhopalocera) of the Maltese Islands*. Naturalista Sicil., S. IV, XLII (1), pp. 3-19. Palermo.

Perjodi tat-titjira: xhur meta jidhru friefet

J F M A M J J A S O N D

Daqs tal-farfett:

žgħir medju kbir

Sess:

♀ Mara' ♂ Ragel

Simboli oħra:

→ Karatteristiċi specifiċi biex tiġi identifikata l-ispeċi



L-Università ta' Malta
Institute of Earth Systems



UK Centre for
Ecology & Hydrology



HELMHOLTZ
Centre for Environmental Research

